

۱۲۷- موهای فر نوع C ، معمولا به شکل خشک هستند .

۱۲۸- موهای خیلی فر دارای سه دسته مختلف هستند .

۱۲۹- موهای نوع ۴A ظاهری همانند سیم داشته و بافتی ظریف دارند .

۱۳۰- ملاتین در بخش کورکتس مو قرار دارد .

۱۳۱- لایه ی کورکتس مو ، ۷۵ تا ۹۰ درصد حجم مو را تشکیل می دهند .

۱۳۲- مواد شماره ۲ در روش ری باندینگ باعث نرم کنندگی مو می شوند .

۱۳۳- تا ۳ روز پس از باندینگ نباید به هیچ عنوان موها خیس شوند .

۱۳۴- در حین انجام ری باندینگ از ست ATS به منظور جلوگیری از آسیب درخشان تر شدن است .

۱۳۵- برای انجام روش برزیلین از کراتین مایع استفاده می شود .

۱۳۶- ملانین و رنگدانه های مو در بخش کورکتس مو قرار دارد .

۱۳۷- بخش اسفنجی ساقه ی مو مدولا نام دارد .

۱۳۸- پلکسی تراپی تا بخش مدولا مو نفوذ میکند .

۱۳۹- مواد پلاکسی تراپی توانایی ساخت پیوند دی سولفیدی کراتین و پروتئین را دارند .

۱۴۰- بخش فولیکول مو در زیر پوست قرار دارد .

۱۴۱- فاصله بین هر دو فولیکول ۱ الی ۲ میلی متر است .

۱۴۲-رنگ کردن مو در سلامت و رشد مو تاثیر زیادی ندارد .

۱۴۳-در مرحله آناژن چرخش رشد مو تقسیم سلولی در ریشه مو و فولیکول انجام شده و مو شروع به رشد می کند.

۱۴۴-مرحله ی رشد به فاز چرخش آناژن مو گفته می شود .

۱۴۵-در مرحله ی آناژن پیاز مو به عمق پوست نفوذ می کند .

۱۴۶-مرحله ی انازن ۳ تا ۵ سال طول می کشد .

۱۴۷-طولانی ترین مرحله ی رشد مو آناژن می باشد .

۱۴۸-اگر موها از اندازه ی مشخصی بلندتر نمیشوند ، فاز آناژن چرخش رشد مو نسبت به حالت عادی زمان کوتاه تری دارد .

۱۴۹-ری باندینگ روشی برای صاف کردن دائمی مو می باشد .

۱۵۰-فاز کاتاژن در چرخه ی رشد مو یک تا سه هفته طول می کشد .

۱۵۱-در مرحله رشد کاتاژن پیاز مو از رگهای خونی روی پوست سر جدا می شود .

۱۵۲-در مرحله کاتاژن از چرخه رشد مو در نهایت مو از فولیکول جدا می شود .

۱۵۳-مرحله تلوزن در رشد مو سه ماه طول می کشد .

۱۵۴-مو های نوع ۴B و ۴C بیشتر دارای فر Z شکل است .

۱۵۵- استفاده از روغن نارگیل ، یکی از بهترین انتخاب های نرم کننده ، برای مراقبت از مو های ۴C است .

۱۵۶- موهای نوع ۴C فر ، حتی با شانه کردن خشک ممکن است به راحتی بشکند .

۱۵۷- در هر زمان حدود ۶ تا ۸ درصد از موها در فاز ریزش یا اگزوزن قرار دارند .

۱۵۸- طول مو در نمیتواند بر روی کراتینه کردن و اثر آن در آینده تاثیر گذار باشد .

۱۵۹- عوامل ژنتیک از عوامل موثر در سلامت مو خارج از کنترل است .

۱۶۰- خاصیت تیره کردن مو در اسپری های حالت دهنده ی مو وجود ندارد .

۱۶۱- ضخامت موهای نوع ۲A نازک است .

۱۶۲- افرادی که موهای فر دارند ، به دو دسته تقسیم می شوند .

۱۶۳- موهای فر بر اساس فاکتور ضخامت مو دسته بندی می شوند .

۱۶۴- موی فر دسته ۳A دارای حلقه هایی آزادتر و بیشتر هستند .

۱۶۵- کراتین به این صورت انجام میشود که دسته ای کوچک از موها را باز میکنیم و سپس واد را با شانه روی ساقه آن ها می زنیم .

۱۶۶- استفاده از روغن درخت چای از روش های مختلف افزایش حجم مو نیست .

۱۶۷- در اثر ماساژ موها ، فولیکول های مو میتوانند مواد مغذی بیشتری را از خون جذب کنند .

۱۶۸- هنگامی که پوست سر ماساژ داده شود ، سر گرم شده و خون رسانی به آن بیشتر می شود .

۱۶۹- پس از ماساژ کف سر حداقل به مدت ۲ ساعت موها نباید شسته شوند .

۱۷۰- لینالول و لینالیل استات به وفور در اسطوخودوس یافت می شود .

۱۷۱- یکی از مهمترین مسائل در مورد سلامت پوست و مو کنترل ویژگی رفتاری استرس است .

۱۷۲- در حالتی که انسان استرس شدید داشته باشد ، بافت کوتیکول به حالت خواب در می آید .

۱۷۳- مواد شیمیایی مانند دکلره باعث تخریب بخش کوتیکول مو می شوند .

۱۷۴- از دستگاه ماکرومیست ، قبل از شروع کار استفاده می شود .

۱۷۵- بهتری انتخاب برای رنگ مو ، ۳ درجه تفاوت نسبت به رنگ طبیعی است .

۱۷۶- بهترین بازه ی زمانی بین دو رنگ مو ۸ تا ۱۰ هفته است .

۱۷۸- استفاده از شامپو های نرم کننده قبل از کراتین ، سبب می شود کراتین به درون ساقه نفوذ

نکند .

۱۷۹- مواد را با فاصله یک سانتی متری از پوست سر ، باید به موها زد .

۱۸۰- موخوره باعث شکافته شدن بخش کوتیکول مو می شود .

۱۸۱- هرچه موها بلندتر باشند ، موخوره در آن شایع تر است .

۱۸۲- انتهای موهای بلند که قدمت بیشتری دارند ، دهیدراته و خشک می شوند .

۱۸۳-موهای موج دار شکلی S مانند دارند .

۱۸۴-جنس موهای موج دار معمولی است .

۱۸۵-سه دسته موی موج دار وجود دارد .

۱۸۶-مدل مو ۲A در انتهای ساقه مو انحنادار می شوند .

۱۸۷-زمانی که کوتیکول مو آسیب میبیند موها شروع به خشک شدن می کنند .

۱۸۹-لوریل سولفات از عوامل کف کننده در شامپوها هستند .

۱۹۰-حساسیت پوست سر خود را به صورت قرمزی و خارش نشان می دهد .

۱۹۱-در ترکیبات محصولات آرامش بخش پوست ، بیسابول وجود دارد .

۱۹۲-صاف کردن موی ژاپنی میتواند تا ۶ ماه ادامه داشته باشد .

۱۹۳-استفاده از محصولات که ترکیبات مضر مانند فرمالدهید دارند ، سبب التهاب مو نمی شوند .

۱۹۴-MSDS نوع موی مشتری را ارائه نمی دهد .

۱۹۵-اگر PH موها بالا باشد ، باعث ترک خوردن کوتیکول در ظاهر موها می شود .

۱۹۶-برای کراتین لونیکس و موهایی که به شدت آسیب دیده اند ۷ بار اتو کشی مناسب است .

۱۹۷-پتید ها و امگا باعث درخشان شدن موها می شود .

۱۹۸-عامل تعیین کننده ی نوع فر شکل فولیکول می باشد .

۱۹۹- شنبیله در ماده معدنی سدیم نیست .

۲۰۰- شنبیله از چربی مو جلوگیری نمی کند .

۲۰۱- در زمان شست و شوی موها جهت صاف کردن مو با مواد پروتئینی ، سه بار باید از شامپوی معمولی استفاده کرد .

۲۰۲- پس از شستن موها ، باید آنها را تا ۸۰ درصد خشک نمود .

۲۰۳- بعد از آغشته کردن موها به مواد مورد استفاده ، باید موها را از بالا به پایین جهت داد .

۲۰۴- باز شدن فلس مو باعث ، باعث خارج شدن کراتین از مو می شود .

۲۰۵- گلوبال به مدت سه روز به جهت قرنطینه ، نیاز دارد .

۲۰۶- برای کراتین های یک و دومرحله ای ، خیلی استفاده از ماسک اهمیت ندارد .

۲۰۷- یکی از اثراتی که صاف کردن دائمی مو روی آن دارد ، شکستن ساقه مو می باشد .

۲۰۸- پلکس تراپی به منظور رفع آسیب های مو انجام می شود .

۲۰۹- پلکس ها باعث حفظ پیوند های دی سولفیدی در برابر رنگ و دکلره می شوند .

۲۱۰- ترمیم سولفور های آزاد مو به واسطه ی پلکس تراپی انجام می شود .

۲۱۱- برای هیدراسیون و بازسازی مو نیاز به ماده ی کلاژن هیدرولیزه داریم .

۲۱۲- نقش ماده ی اوژن در ترمیم موهای آسیب دیده تجمع و بازسازی مدولا است .

- ۲۱۳- تحریک فولیکول با استفاده از پروتئین شیر بدست می آید .
- ۲۱۴- برای محافظت از لایه های داخلی مو از آرژانین و آمینواسید استفاده می شود .
- ۲۱۵- در استفاده از کراتین و نیکس ، نیازی به انجام براشینگ نیست .
- ۲۱۶- در بخش ساقه مو ، اتو کشی باید به صورت متوالی و مداوم انجام شود .
- ۲۱۷- نقش آرژانین و آمینواسید در ترکیب پلک فلور اکتیو ، محافظ لایه های داخلی است .
- ۲۱۸- بخش بالایی بافت مو ، شامل اینفاندیبولوم می باشد •
- ۲۱۹- هیدراسیون جزء اثرات روغن مورینگا بر روی مو نمی باشد .
- ۲۲۰- بخش فوقانی ، از ورودی مجرای غدد سبابه تا محل روزنه فولیکولی ادامه دارد .
- ۲۲۱- ایستموس ، در بخش میانی مو قرار دارد .
- ۲۲۲- هرچه موها آسیب بیشتری دیده باشند ، احیای مو سخت تر می شود .
- ۲۲۳- فرایند صاف کردن مو حدود ۲ تا ۶ ساعت به زمان نیاز دارد .
- ۲۲۴- بعلت ریزش مو و نازک شدن ساقه ی مو ، کاهش تراکم مو اتفاق میفتد .
- ۲۲۵- در صورتی که آسیب مو شدید باشد ، نسبت ترکیب وان پلکس آب ۱ به ۴ است .
- ۲۲۶- پس از اسپری مواد وان پلکس ، ماساژ موها شروع می شود .
- ۲۲۷- در هنگام استفاده از موادوا پلکس ، موا به کف سر نباید برسد .

۲۲۸- مور فر دسته ۳B ، دارای حلقه های فنری مشخص هستند .

۲۲۹- پیاز و فوق پیاز مربوط به بخش های تحتانی مو هستند .

۲۳۰- بخش بالایی بافت مو ، اینفاندیبولوم است .

۲۳۱- در بخش پایینی بافت مو ، از قاعدع فولیکول ها تا قرار گیری عضله ارکتو پیلی ادامه دارد .

۲۳۲- روش های درمانی ریزش مو ، ارتباط مستقیمی با سیستم بدنی فرد دارد .

۲۳۳- تغییر بافت مو ناشی از عدم تعادل در بدن است .

۲۳۴- لینالول و لینالیل استات ، به ویژگی نازک شدن مو منجر نمی شوند .

۲۳۵- زمانی که آسیب موها بسیار شدید باشد ، توصیه میشود مواد وان پلکس را با بوتاکس ها ترکیب کنند .

۲۳۶- نسبت ترکیب پلکس با مواد بوتاکس یک به ده می باشد .

۲۳۷- برای ترمیم با استفاده از اولاپلکس آنرا با آب مقطر ترکیب می کنند .

۲۳۸- مرحله بعد از اتو کشی مو به دو نوع دسته بندی می شود .

۲۳۹- تفاوت کراتین هایی که قرنطینه دارند در زمان قرنطینه می باشد .

۲۳۰- ماده کراتی لونیکس ، به مدت یک ساعت جهت قرنطینه نیاز دارد .

۲۳۱- استفاده از روش صاف کردن ژاپنی باعث میشود تا نگهداری مو راحت تر باشد .



۲۳۲- در روش صاف کردن ری باندینگ مو باعث میشود تا موخوره ها از بین رفته و موها صاف شوند .

۲۳۴- بخش زیر پوست ساختار مو ، ریشه نام دارد .

۲۳۵- مقدار ماده سازنده جنس مو در قسمت فولیکول مو تنظیم می شود .

۲۳۶- پیوند های بین مولوکولی سبب ایجاد فر در مو می شوند .

۲۳۷- جنس کراتین از پروتئین می باشد .

۲۳۸- در استفاده از مواد اولای پلکس ، پس از گذاشتن آن روی بخش آسیب دیده به مدت ۱۰ دقیقه باید آن را ماساژ دهیم .

۲۳۹- پس از ۱۰ دقیقه ماساژ مواد اولای پلکس بر روی موها به مدت ۵ دقیقه باید زمان استراحت برای آن در نظر گرفت .

۲۴۰- پس از آبکشی مواد اولای پلکس ، مو را براشینگ کرده و تا ۴۸ ساعت باید آن را قرنطینه کرد .

۲۴۱- روش کراتین گلوبال سه مرحله ای نیست .

۲۴۲- کراتین دو مرحله ای شامل ، شامپو و کراتین می باشد .

۲۴۳- مشتری انتظار مجعد کردن مو در کراتین تراپی ندارد .

۲۴۴- در زمانیکه موها آسیب بیشتری دیده باشند ، فلس مو بازتر است .

۲۴۵- در زمانی که آسیب مو شدید باشد ، ، احتمال دارد پلکس تراپی اثرگذار نباشد .

۲۴۶- اگر موها کشیدگی ۴ برابر را تجربه کرده باشند ، پس از مرحله اول پلکس تراپی تغییر یک برابر می کنند .

۲۴۷- برای ۵۰ گرم رنگ یا دکلره ، ۱۰ میلی لیتر وان پلکس اکتیو استفاده می شود .

۲۴۸- پروتئین تراپی با اتصال پروتئین های هیدرولیز شده به کوتیکول ، باعث تقویت کوتیکول و ترمیم ساقه ی مو می شود .

۲۴۹- پروتئین تراپی باعث از بین بردن تخلخل ساقه ی مو می شود .

۲۵۰- هرچه مو پیوند های کمتری داشته باشد مو به صورت صاف می باشد .

۲۵۱- فلوراکتیو ها در رنگ های بنفش و قهوه ای تولید می شوند .

۲۵۲- پروتئین های قهوه ای مخصوص موهای سالم می باشند .

۲۵۳- در پروتئین بنفش مواد پلکس بکار رفته می شود .

۲۵۴- همزمان با مواد زدن کراتین بر روی مو ، عمل شانه زدن نیز باید انجام شود .

۲۵۵- پس از مواد زدن تمام بخش های مو ، میتوانیم حدود ۴۵ دقیقه تا یک ساعت موها را کامل کاور کنیم .

۲۵۶- در صورت گذاشتن مواد کراتین در مکانی سرد کیفیت آن پایین می آید .

۲۵۷- ضخیم ترین نوع موهای صاف ، مربوط به دسته نوع ۱C هستند .

۲۵۸-بهترین حالتی که میتوانیم به مو نوع ۱C مدل دهیم ، کوتاه کردن لایه ای آن است .

۲۵۹-موهای فر نوع A تمایل زیادی دارد تا به سمت مجعد شدن بروند .

۲۶۰-پروتئین بنفش برای دسته موهای دکلره یا رنگ شده بسیار مناسب هستند .

۲۶۱-مهمترین تفاوت پروتئین های بنفش و قهوه ای در نوع مویی که اعمال می شود است .

۲۶۲-پروتئین فلور اکتیو بنفش برای موهای دکاره کاربرد دارد .

۲۶۳-در استفاده از پروتئین قهوه ای موها تا ۸۰ درصد باید خشک می شوند .

۲۶۴-برای استعمال مواد پروتئین بر روی مو ، موهای سر را به ۴ قسمت مساوی باید تقسیم کرد .

۲۶۵-پس از زدن مواد پروتئین به مو و ماساژ آن به مدت ۴۰ تا ۶۰ دقیقه باید به مو فرصت داد و آن را کاور کرد .

۲۶۶-پس از ۴۰ تا ۶۰ دقیقه فرصت به موها و کاور آنها در پروتئین تراپی بهتر است حرارت ملایمی  
روی موها با سشوار انجام داد .

۲۶۷-از دستگاه هایی مانند ماکرومیست و نانو استیم فقط در مرحله ی قبل از شروع کار در پروتئین تراپی میتوان استفاده کرد .

۲۶۸-به دلیل وجود آلرژی های نهان توصیه میشود که زنان باردار از مواد فلور اکتیو استفاده نکنند .

۲۶۹- برای استفاده از پروتئین های P و A در ابتدار کار پس از شستن و خشک کردن موها باید مقدار رطوبت بسیست درصد داشته باشند .

۲۷۰- استفاده از کراتینه قسمت کوتیکول مو را تحت تاثیر قرار می دهد .

۲۷۱- بین کراتین ها میتوان گفت کراتین گلوبال تک مرحله ای نیست .

۲۷۲- بین کراتین ها میتوان گفت کراتین لونیسک دو مرحله ای است .

۲۷۳- کراتین در قشر مو یافت می شود .

۲۷۴- با پیچاندن موها در اطراف صاف کننده فرهای هالیوودی ایجاد می شود .

۲۷۵- نانو پلاستیک برای صاف کردن مو ضروری است .

۲۷۶- بزرگترین عوامل آسیب رسان مو محصولات حرارتی و قرار گرفتن در معرض نور خورشید است .

۲۷۷- اسید های آمینه و پپتید ها جزء تشکیل دهنده پروتئین های هیدرولیز می باشند .

۲۷۸- موها از آب کراتین چربی ها مواد معدنی و رنگ دانه ها ساخته شده اند .

۲۷۹- درمان کراتینه سری آمازون ، ترکیبی از مواد معدنی و اسید آمینه است که مو را تقویت می کند

۲۸۰- امواج برق با حرکت در آوردن اتو مو به شکل S ایجاد می شوند .

۲۸۱- صاف کردن موها با مواد پروتئینی فرآیندی شیمیایی است .

۲۸۲- موهای مجعد با هیدراتاسیون کراتین حالت پذیر تر می شوند .

۲۸۳- کاهش حجم و رفع موخوره به روش سری آمازون انجام می شود .

۲۸۴- عارضه درماتیت تحریک کننده بسیار شایع و واکنشی نسبت به مواد تحریک کننده مانند

صابون ها و نرم کننده ها است .

۲۸۵- با بستن کوتیکول مو در هنگام کراتین موها آنها کمتر وز می شوند .

۲۸۶- موهای مجعد و دارای بافت با هیدراتاسیون کراتین حالت پذیر تر می شوند .

۲۸۷- سه قسمت مو ، کوتیکول - قشر و مدولا است .

۲۸۹- در روش امواج گران از تکنیک زاویه گیری استفاده می کنند .

۲۹۰- کراتین از ۱۸ اسید آمینه تشکیل شده است .

۲۹۱- درمان کراتینه کرافیوژن موها را ابریشمی براق و سالم می کند .

۲۹۲- درمان کراتین به مدت ۶ ماه در صورت مراقبت درست از موها طول می کشد .

۲۹۳- برای از بین بردن موخوره و فرهای خارج از کنترل از روش کراتینه کارافیوژن استفاده می شود .

۲۹۴- ترکیب کراتین با بخار آب سبب تغییر شکل می شود .

۲۹۵- درمان کراتینه با ترکیب پروتئین هیدرولیز خارجی ترین لایه کوتیکول مو را تقویت می کند .

۲۹۶- برای ارائه خدمات کراتین به ۵ تا ۶ مشتری یک بطری کراتین کافی است .

۲۹۷- کراتینه سامبای برزیلی از محو شدن رنگ مو جلوگیری می کند .

۲۹۸-بهترین درمان کراتینه موها وز نانو کراتینه است .

۲۹۹-پروتئین هیدرولیز متشکل از مواد اسید های آمینه و پپتید ها است .

۳۰۰-پروتئین درمانی بیش از حد باعث شکنندگی و ضعیف شدن موها می شود .